

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG HÒA

Kính thưa các bác sĩ huynh!

Hiện nay bệnh sởi và các biến chứng của sởi đã gây rất nhiều ca tử vong trong phạm vi cộng đồng, tính đến thời điểm hiện tại đã có 112 ca tử vong do sởi và các biến chứng của bệnh sởi. Sởi là một bệnh cấp tính lây lan: trong gia đình nếu có một người bị bệnh thì có đến 90% người tiếp xúc có miễn dịch sẽ bị nhiễm bệnh. Tỷ lệ lây lan trong cộng đồng của bệnh sởi vô cùng cao. Vậy bệnh sởi là bệnh như thế nào?

1) Sởi là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus sởi gây ra với các triệu chứng sốt, phát ban, chảy nước mũi, ho, mất tiếng... bệnh có thể gặp ở trẻ em, người lớn nếu không có miễn dịch phòng bệnh, có thể gây thành dịch.

2) Những dấu hiệu của bệnh sởi?

- Sốt 38-40 độ C và sốt liên tục.

- Ho (có thể ho khan, khàn tiếng hoặc có đờm), chảy mũi, viêm kết mạc (đỏ mắt, phù nề mí), mắt đỏ, tiêu chảy.

- Có những nốt nhỏ (nốt Koplick) kích thước khoảng 1mm nổi lên trên niêm mạc má, dễ quan sát khi trẻ há miệng to; nốt có màu trắng hoặc hồng nhạt, viền trắng xung quanh răng hàm trên. Dấu hiệu này xuất hiện nhanh trong vòng 12 đến 18 giờ.

- Sau khi sốt 3 đến 4 ngày, trẻ bắt đầu phát ban. Đầu tiên ban mọc trên chân tóc, sau tai, lan dần hai bên má, cổ, ngực, tay, bụng, sau lưng, hông rồi xuống chân. Ban màu hồng nhạt, nhàn nhạt, khi nhìn vào thì biến mất, có xu hướng kết dính lại với nhau, phát ban xen kẽ những khoảng da lành. Ban có thể rỉ rác hoặc dày, có thể ngứa ít.



Bệnh sởi

Viết bởi Administrator

Thủ quỹ, 25 Tháng 2 2017 09:16 - Lần cập nhật cuối: Thứ 6, 07 Tháng 4 2021 09:59

- Trẻ ăn kém, mệt mỏi. Thông thường thì 3 đến 4 ngày sau khi ban mọc, ban sẽ bắt đầu bay theo thứ tự như khi mọc và dần dần biến mất trên da, có thể có bong vảy nhỏ, khoảng một tuần sau thì không còn dấu vết gì.

Khi trẻ có các dấu hiệu của bệnh sởi nên đưa đến các cơ sở y tế ban đầu gần nhất để được khám, điều trị và hướng dẫn chăm sóc kịp thời, hướng chuyển trẻ lên bệnh viện tuyến trên (nếu đang điều trị các ca sởi nặng) để tránh nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.



Tiền vắc xin sởi là biện pháp hiệu quả nhất phòng bệnh sởi. Trẻ cần được tiêm 2 mũi vắc xin sởi. Mũi thứ nhất được tiêm cho trẻ từ 9 đến 11 tháng tuổi, mũi thứ hai được tiêm khi trẻ được 18 tháng tuổi. Khi trẻ được tiêm 2 mũi vắc xin theo lịch tiêm chủng hoc sau khi mọc sởi, trẻ sẽ có miễn dịch bền vững.

- Khi trẻ mọc sởi hoc nghi ngờ mọc sởi cần cách ly trẻ để tránh lây nhiễm cho trẻ khác.

NVYT

Nguyễn Thị Hoa